

# Anti-BrdU 小鼠单克隆抗体

**K236153** -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	溴脱氧尿嘧啶核苷
别名	Bromodeoxyuridine, Bromodeoxyuridine, 5-Bromo-2'-deoxyuridine; 5-BrdU, Proliferation Marker; 5-Bromo-2-deoxyUridine
免疫原	KLH 偶联的小鼠 BrdU 合成肽
抗体亚型	IgG1, κ
克隆号	4B6C12
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核

## 应用

### IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: Species independent

稀释比: 1: 100-1: 500

阳性样品: 盲肠, 小肠


## 背景

Bromodeoxyuridine (5-bromo-2'-deoxyuridine, BrdU, BUdR, BrdUrd) is a synthetic nucleoside that is an analog of thymidine. It can be incorporated into the newly synthesized DNA of replicating cells (during the S phase of the cell cycle), substituting for thymidine during DNA replication. As such, BrdU is used for birth dating and monitoring cell proliferation. BrdU is a toxic and mutagenic substance. It triggers cell death, the formation of teratomas, alters DNA stability, lengthens the cell cycle, and has mitogenic, transcriptional and translational effects on cells that incorporate it.


## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



IHC 检测 BrdU 蛋白(货号 K236153).  
 样品: 小鼠小肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 在 37°C下用 2M HCL 在纯水中变性 30 分钟.  
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 BrdU 蛋白(货号 K236153).  
 样品: 大鼠盲肠, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.  
 抗原修复: 在 37°C下用 2M HCL 在纯水中变性 30 分钟.  
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟.

**For Research Use Only!**

**Ver. No.: V1-202603**