

Anti-TBC1D7 兔多克隆抗体

K135970 -20°C



产品信息

| | |
|---------------|--|
| 蛋白质全称 | TBC1 结构域家族成员 7 |
| 别名 | Tbc1d7, cell migration-inducing protein 23, dJ257A7.3, DKFZp686N2317, FLJ32666, PIG51, TBC1 domain family member 7, TBC7, TCD1D7 |
| 免疫原 | 小鼠 TBC1D7 重组蛋白 |
| Uniprot ID | Q9D0K0 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量 / 观测分子量 | 34 kDa / 36 kDa |

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 睾丸


背景

TBC1 domain family member 7 (TBC1D7, TBC7) belongs to a family of TBC (Tre-2/Bub2/Cdc16) containing proteins that function as GTPase-activating proteins (GAPs). TBC1D7 was initially identified as a novel binding protein within the TSC1-TSC2 complex, where it was thought to associate with TSC1. Additional research indicates that TBC1D7 is a third subunit of the TSC1-TSC2 complex that possesses Rheb-GAP activity and signals upstream of mTORC1.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C 下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 TBC1D7 蛋白(货号 K135970).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603