

Anti-NCR1 兔多克隆抗体

K1333306 -20°C



产品信息

蛋白质全称	自然细胞毒性触发受体 1
别名	Activating receptor 1, mAR-1, Lymphocyte antigen 94, Natural killer cell p46-related protein, NK-p46, NKp46, mNKp46, CD335, NCR1, Ly94, Ncr1, Ly94
免疫原	小鼠 NCR1 重组蛋白
Uniprot ID	Q8C567
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	37 kDa / 46 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 胸腺


背景

Cytotoxicity-activating receptor that may contribute to the increased efficiency of activated natural killer (NK) cells to mediate tumor cell lysis. When LY94 is expressed in COS-7 cells, anti-NKp46 immunoprecipitates a 46-kD surface molecule. Northern blot analysis revealed weak expression of a major transcript of 3.4 kb in spleen but in no other human tissue. Further analysis, with RT-PCR confirmation, in various lymphoid and myelomonocytic cells revealed that LY94 expression is confined to NK cells.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 NCR1 蛋白(货号 K1333306).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603