

Anti-PPAR delta 兔多克隆抗体

K1333861 -20°C



产品信息

蛋白质全称	过氧化物酶体增殖物激活受体δ
别名	FAAR, NR1C2, NUC1, NUCI, NUCII, Nuclear hormone receptor 1, PPAR beta, PPAR delta, PPARB, PPARD, PPAR-beta, Ppard, Nr1c2, Pparb
免疫原	KLH 偶联的小鼠 PPAR delta 合成肽
Uniprot ID	P35396
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	50 kDa / 50 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：心


背景

Peroxisome proliferator-activator receptor delta (PPARD), a ligand-activated transcription factor, belongs to the PPARs family, which get its name for their chemicals that induce proliferation of peroxisomes, organelles that contribute to the oxidation of fatty acids. PPARD is a receptor for peroxisome proliferator and once activated by a ligand, it binds to and activates the promoter elements of target genes, such as acylCoA oxidase gene. Regulates the peroxisomal beta-oxidation pathway of fatty acids. Functions as transcription activator for the acyl-CoA oxidase gene and it can also act as a repressor for the NPC1L1 gene.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C 下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 PPAR delta 蛋白(货号 K1333861).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3% 脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603