

# Anti-SND1 兔多克隆抗体

K1335706 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	含葡萄球菌核酸酶结构域蛋白 1
别名	100 kDa coactivator, p100 co-activator, SND1, TRD11, Tudor domain-containing protein 11, p100 EBNA2 co activator, p100
免疫原	小鼠 SND1 重组蛋白
Uniprot ID	Q78PY7
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	102 kDa / 102 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 胰腺, 肝


## 背景

Staphylococcal nuclease domain-containing 1 (SND1), is a multifunctional nuclease that consists of four staphylococcal nuclease domains and a tudor domain. SND1 acts as a coactivator that facilitates transcriptional activity of STAT5, 6 and c-Myc. SND1 is a comprising part of the RNA-induced silencing complex(RISC), and takes part in the functions of miRNA, regulates transcription through transcriptional coactivation, RNA interference, RNA splicing, and RNA editing.

## 储存条件

**储存条件:** 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。  
**储存缓冲液:** 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 SND1 蛋白(货号 K1335706).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,  
 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:  
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603