

Anti-Cyclin E1 兔多克隆抗体

K1335808 -20°C



产品信息

蛋白质全称	G1/S 期特异性周期蛋白 E1
别名	CCNE1, CCNE, pcyclin E1, Cyclin E1
免疫原	KLH 偶联的小鼠 Cyclin E1 合成肽
Uniprot ID	Q61457
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞核
预测分子量 / 观测分子量	47 kDa / 47 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 200-1: 400
 阳性样品:

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人, 小鼠, 大鼠
 稀释比: 1: 100-1: 400
 阳性样品: 睾丸


背景

Cyclin E1 (CCNE1) is a member of the highly conserved cyclin family, whose members are characterized by a dramatic periodicity in protein abundance through the cell cycle. CCNE1, an essential cyclin activating Cdk2, regulates the G1-S phase transition of the mammalian cell division cycle. Its timing expression plays a direct role in the initiation of DNA replication, the control of histone biosynthesis, and the centrosome cycle. CCNE1 is associated with disease progression in various malignancies and is associated clinically with poor prognosis.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Cyclin E1 蛋白(货号 K1335808).
 样品: 小鼠睾丸, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计 2 分钟.
 一抗: 1: 300 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔), 即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603