

# Anti-TGF beta Receptor II 兔多克隆抗体

K1336732 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	TGF-β受体 2 型
别名	TGFR-2, TGF-beta type II receptor, Transforming growth factor-beta receptor type II, TGF-beta receptor type II, TbetaR-II, Tgfbr2
免疫原	小鼠 TGF beta Receptor II 重组蛋白
Uniprot ID	Q62312
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	64 kDa / 64 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：人, 小鼠, 大鼠

稀释比：1: 500-1: 1000

阳性样品：脑

## 背景

Transmembrane serine/threonine kinase forming with the TGF-beta type I serine/threonine kinase receptor, TGFR1, the non-promiscuous receptor for the TGF-beta cytokines TGFB1, TGFB2 and TGFB3. Transduces the TGFB1, TGFB2 and TGFB3 signal from the cell surface to the cytoplasm and is thus regulating a plethora of physiological and pathological processes including cell cycle arrest in epithelial and hematopoietic cells, control of mesenchymal cell proliferation and differentiation, wound healing, extracellular matrix production, immunosuppression and carcinogenesis. The formation of the receptor complex composed of 2 TGFR1 and 2 TGFR2 molecules symmetrically bound to the cytokine dimer results in the phosphorylation and the activation of TGFR1 by the constitutively active TGFR2.

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 TGF beta Receptor II 蛋白(货号 K1336732).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603