

# Anti-FGF2 兔多克隆抗体

K1341907 -20°C



## 产品信息

蛋白质全称	成纤维细胞生长因子 2
别名	FGFB, FGF-2, Basic fibroblast growth factor, HBGH2, HBGF-2, Prostatropin, Heparin binding growth factor 2 precursor, BFGF, FGF2, Basic FGF
免疫原	KLH 偶联的人 FGF2 合成肽
Uniprot ID	P09038
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	31 kDa / 18/21/24 kDa

## 应用

### WB 免疫印迹

物种：人

稀释比：1: 400-1: 800

阳性样品：HeLa 细胞, Hep G2 细胞


## 背景

The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members bind heparin and possess broad mitogenic and angiogenic activities. This protein has been implicated in diverse biological processes, such as limb and nervous system development, wound healing, and tumor growth. The mRNA for this gene contains multiple polyadenylation sites, and is alternatively translated from non-AUG (CUG) and AUG initiation codons, resulting in five different isoforms with distinct properties.

## 储存条件

**储存条件：**自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。  
**储存缓冲液：**含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

## 图像



WB 检测 FGF2 蛋白(货号 K1341907).  
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.  
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.  
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.  
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603