

Anti-Granzyme B 小鼠单克隆抗体

K236276 -20°C



产品信息

蛋白质全称	颗粒酶 B
别名	CCPI, CGL 1, CGL1, CSP B, CSPB, CTLA1, CTSLG1, Endogenous granzyme B, Granzyme B, GZMB, HLP, SECT
免疫原	人 Granzyme B 重组蛋白(HEK293 表达)
Uniprot ID	P10144
抗体亚型	IgG1
克隆号	3D8A2
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型, 胞质颗粒

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人

稀释比: 1: 500-1: 1500

阳性样品: 结肠, 食管癌


背景

Abundant protease in the cytosolic granules of cytotoxic T-cells and NK-cells which activates caspase-independent pyroptosis when delivered into the target cell through the immunological synapse. It cleaves after Asp. Once delivered into the target cell, acts by catalyzing cleavage of gasdermin-E (GSDME), releasing the pore-forming moiety of GSDME, thereby triggering pyroptosis and target cell death. Seems to be linked to an activation cascade of caspases (aspartate-specific cysteine proteases) responsible for apoptosis execution. Cleaves caspase-3, -7, -9 and 10 to give rise to active enzymes mediating apoptosis.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IF 检测 Granzyme B 蛋白(货号 K236276)(红色)。
 样品: 人结肠, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) (货号 KB63903), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。



IF 检测 Granzyme B 蛋白(货号 K236276)(红色)。
 样品: 人食管癌, 4%多聚甲醛(货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟。
 封闭: 3% BSA (货号 KSGC305010) 的 PBS 溶液, 室温孵育 30 分钟。
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: Cy3 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) (货号 KB63903), 1: 300 稀释, 室温孵育 1 小时。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603