

Anti-PD-L1 兔多克隆抗体

K1347208 -20°C



产品信息

| | |
|---------------|---|
| 蛋白质全称 | 程序性细胞死亡蛋白 1 配体 1 |
| 别名 | CD274, B7-H, B7H1, PDL-1, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDL1, CD274 molecule, Programmed cell death 1 ligand 1 |
| 免疫原 | KLH 偶联的人 PD-L1 合成肽 |
| Uniprot ID | Q9NZQ7 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 亚细胞定位 | 细胞膜 |
| 预测分子量 / 观测分子量 | 33 kDa / 40-55 kDa |

应用

WB 免疫印迹

物种: 人
 稀释比: 1: 500-1: 1000
 阳性样品: A549 细胞

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人
 稀释比: 1: 300-1: 600
 阳性样品:

背景

Plays a critical role in induction and maintenance of immune tolerance to self. As a ligand for the inhibitory receptor PDCD1/PD-1, modulates the activation threshold of T-cells and limits T-cell effector response. Through a yet unknown activating receptor, may costimulate T-cell subsets that predominantly produce interleukin-10 (IL10). Can also act as a transcription coactivator: in response to hypoxia, translocates into the nucleus via its interaction with phosphorylated STAT3 and promotes transcription of GSDMC, leading to pyroptosis. The PDCD1-mediated inhibitory pathway is exploited by tumors to attenuate anti-tumor immunity and escape destruction by the immune system, thereby facilitating tumor survival. The interaction with PDCD1/PD-1 inhibits cytotoxic T lymphocytes (CTLs) effector function.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C 下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 PD-L1 蛋白(货号 K1347208).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3% 脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603