

Anti-PIAS2 兔多克隆抗体

K135976 -20°C


产品信息

蛋白质全称	E3 SUMO 连接酶 PIAS2
别名	Androgen receptor-interacting protein 3, DIP, Msx-interacting zinc finger protein, ARIP3, DAB2-interacting protein, Protein inhibitor of activated STAT2, RING-type E3 ubiquitin transferase PIAS2, Miz1, Piasx
免疫原	小鼠 PIAS2 重组蛋白
Uniprot ID	Q8C5D8
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	68 kDa / 68 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 肾

背景

PIAS2 Antibody: The PIAS (protein inhibitor of activated STAT) proteins play a crucial role as transcriptional coregulators in various cellular pathways, including the STAT, p53 and the steroid hormone signaling pathway. The PIAS protein family includes at least five evolutionarily conserved genes, including PIAS2. The major function of the PIAS proteins is the control of gene transcription and can also act as small ubiquitin-like-modifier (SUMO) E3 ligases.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 PIAS2 蛋白(货号 K135976).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603