

Anti-TNF Receptor II 兔多克隆抗体

K1333039 -20°C


产品信息

蛋白质全称	肿瘤坏死因子受体超家族成员 1B
别名	Tumor necrosis factor receptor 2, TNFR2, p75, Tumor necrosis factor receptor type II, TNFRII, p80 TNF-alpha receptor, CD120b, Etanercept, TBP-2, TBPII, TNFRSF1B, TNFBR
免疫原	KLH 偶联的人 TNF Receptor II 合成肽
Uniprot ID	P20333
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	48 kDa / 73 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人
 稀释比：1: 500-1: 1000
 阳性样品：Jurkat 细胞


背景

The protein encoded by this gene is a member of the TNF-receptor superfamily. This protein and TNF-receptor 1 form a heterocomplex that mediates the recruitment of two anti-apoptotic proteins, c-IAP1 and c-IAP2, which possess E3 ubiquitin ligase activity. The function of IAPs in TNF-receptor signalling is unknown, however, c-IAP1 is thought to potentiate TNF-induced apoptosis by the ubiquitination and degradation of TNF-receptor-associated factor 2, which mediates anti-apoptotic signals. Knockout studies in mice also suggest a role of this protein in protecting neurons from apoptosis by stimulating antioxidative pathways.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C 下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50% 甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 TNF Receptor II 蛋白(货号 K1333039).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3% 脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603