

Anti-KDM5A/Jarid1A/RBBP2 兔多克隆抗体

K1333261 -20°C


产品信息

蛋白质全称	赖氨酸特异性去甲基化酶 5A
别名	Histone demethylase JARID1A, Jumonji/ARID domain-containing protein 1A, Kdm5a, Rbp2, RBBP-2, Jarid1a, Retinoblastoma-binding protein 2
免疫原	小鼠 KDM5A 重组蛋白
Uniprot ID	Q3UXZ9
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	192 kDa / 192 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 肝


背景

The protein encoded by this gene is a ubiquitously expressed nuclear protein. It binds directly, with several other proteins to retinoblastoma protein which regulates cell proliferation. This protein also interacts with rhombotin-2 which functions distinctly in erythropoiesis and in T-cell leukemogenesis. Rhombotin-2 is thought to either directly affect the activity of the encoded protein or may indirectly modulate the functions of the retinoblastoma protein by binding to this protein. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 KDM5A/Jarid1A/RBBP2 蛋白(货号 K1333261).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603