

Anti-LTBR 兔多克隆抗体

K1334377 -20°C



产品信息

蛋白质全称	肿瘤坏死因子受体超家族成员 3
别名	Lymphotoxin-beta receptor, Ltbr, Tnfr, Tnfrsf3, LT beta R, LTBETAR, Lymphotoxin B receptor, TNFCR
免疫原	小鼠 LTBR 重组蛋白
Uniprot ID	P50284
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	45 kDa / 45-50 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种: 人, 小鼠, 大鼠

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: 肝

背景

The protein encoded by this gene is a member of the tumor necrosis factor (TNF) family of receptors. It is expressed on the surface of most cell types, including cells of epithelial and myeloid lineages, but not on T and B lymphocytes. The protein specifically binds the lymphotoxin membrane form (a complex of lymphotoxin alpha and lymphotoxin beta). The encoded protein and its ligand play a role in the development and organization of lymphoid tissue and transformed cells. Activation of the encoded protein can trigger apoptosis.

储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 LTBR 蛋白(货号 K1334377).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603