

Anti-MX2 兔多克隆抗体

K1336432 -20°C



产品信息

蛋白质全称	干扰素诱导的 GTP 结合蛋白 Mx2
别名	Myxovirus resistance protein 2, Mx2, MXB, MX dynamin like GTPase 2, p78 related protein, Second interferon induced protein p78
免疫原	小鼠 MX2 重组蛋白
Uniprot ID	Q9WVWP9
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	74 kDa / 74 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人
 稀释比：1: 500-1: 1000
 阳性样品：HeLa 细胞, 293T 细胞


背景

The protein encoded by this gene has a nuclear and a cytoplasmic form and is a member of both the dynamin family and the family of large GTPases. The nuclear form is localized in a granular pattern in the heterochromatin region beneath the nuclear envelope. A nuclear localization signal (NLS) is present at the amino terminal end of the nuclear form but is lacking in the cytoplasmic form due to use of an alternate translation start codon. This protein is upregulated by interferon-alpha but does not contain the antiviral activity of a similar myxovirus resistance protein 1.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 MX2 蛋白(货号 K1336432).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603