

Anti-CD5L/CT-2 兔多克隆抗体

K1337842 -20°C



产品信息

蛋白质全称	CD5 抗原样蛋白
别名	Apoptosis inhibitor expressed by macrophages, mAIM, Apoptosis inhibitory 6, SP-alpha, Cd5l, Aim, Api6
免疫原	KLH 偶联的小鼠 CD5L/CT-2 合成肽
Uniprot ID	Q9QWK4
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	39 kDa / 46 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：大鼠
 稀释比：1: 700-1: 1000
 阳性样品：脾

背景

CD5L is a member of the scavenger receptor cysteine-rich domain superfamily (SRCR-SF) initially identified as an inducible cell surface ligand of CD5. It was shown that CD5L functions in the thymus as the inducer of resistance to apoptosis within CD4+/CD8+ thymocytes and as the supporter of the viability of these cells before thymic selection. CD5L was also shown to support macrophage survival and enhance their phagocytic function.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 CD5L/CT-2 蛋白(货号 K1337842).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 700 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603