

Anti-TIG3 兔多克隆抗体

K1344619 -20°C



产品信息

| | |
|---------------|---|
| 蛋白质全称 | 磷脂酶 A 与酰基转移酶 4 |
| 别名 | HRASLS4, PLA1/2 3, RAR responsive protein TIG3, RARRES3, RIG1, TIG3 |
| 免疫原 | KLH 偶联的人 TIG3 合成肽 |
| Uniprot ID | Q9UL19 |
| 抗体亚型 | IgG |
| 纯化方式 | 亲和纯化 |
| 预测分子量 / 观测分子量 | 18 kDa / 16 kDa |

应用

WB 免疫印迹

物种：人
 稀释比：1: 800-1: 1500
 阳性样品：A-431 细胞

背景

Retinoids exert biologic effects such as potent growth inhibitory and cell differentiation activities and are used in the treatment of hyperproliferative dermatological diseases. These effects are mediated by specific nuclear receptor proteins that are members of the steroid and thyroid hormone receptor superfamily of transcriptional regulators. RARRES1, RARRES2, and RARRES3 are genes whose expression is upregulated by the synthetic retinoid tazarotene. RARRES3 is thought act as a tumor suppressor or growth regulator.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 TIG3 蛋白(货号 K1344619).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液,
 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1:
 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603