

Anti-CD177 兔多克隆抗体

K1345153 -20°C



产品信息

蛋白质全称	CD177 抗原
别名	CD177, HNA-2a, HNA2A, NB1, NB1 GP, PRV-1, PRV1, CD177 molecule
免疫原	人 CD177 重组蛋白
Uniprot ID	Q8N6Q3
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	细胞膜, 分泌型

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人
 稀释比: 1: 250-1: 500
 阳性样品: 胃癌, 肝癌


背景

This gene encodes a glycosyl-phosphatidylinositol (GPI)-linked cell surface glycoprotein that plays a role in neutrophil activation. The protein can bind platelet endothelial cell adhesion molecule-1 and function in neutrophil transmigration. Mutations in this gene are associated with myeloproliferative diseases. Over-expression of this gene has been found in patients with polycythemia rubra vera. Autoantibodies against the protein may result in pulmonary transfusion reactions, and it may be involved in Wegener's granulomatosis.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 µg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 CD177 蛋白(货号 K1345153).
 样品: 人胃癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 400 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.



IHC 检测 CD177 蛋白(货号 K1345153).
 样品: 人肝癌, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时.
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 98°C, 20 分钟.
 一抗: 1: 400 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗兔),即用型 (货号 KB3906), 室温孵育 20 分钟.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603