

Anti-Androgen receptor 兔多克隆抗体

K1346272 -20°C



产品信息

蛋白质全称	雄激素受体
别名	Dihydrotestosterone receptor, HUMARA, HYSPI, KD, NR3C4, SBMA, SMAX1, TFM, Androgen receptor, AIS, AR, DHTR
免疫原	KLH 偶联的人 Androgen receptor 合成肽
Uniprot ID	P10275
抗体亚型	IgG
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	99 kDa / 110 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：小鼠，大鼠

稀释比：1: 300-1: 600

阳性样品：睾丸


背景

Steroid hormone receptors are ligand-activated transcription factors that regulate eukaryotic gene expression and affect cellular proliferation and differentiation in target tissues. Transcription factor activity is modulated by bound coactivator and corepressor proteins. Transcription activation is down-regulated by NR0B2. Activated, but not phosphorylated, by HIPK3 and ZIPK/DAPK3. Isoform 3 and isoform 4 lack the C-terminal ligand-binding domain and may therefore constitutively activate the transcription of a specific set of genes independently of steroid hormones.

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 Androgen receptor 蛋白(货号 K1346272).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 500 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603