

Recombinant Anti-TSG101 antibody (兔单克隆抗体)

K546857 -20°C


产品信息

蛋白质全称	肿瘤易感基因 101 蛋白
别名	TSG10, TSG101, tumor susceptibility gene 101, VPS23, tumor susceptibility 101, Cell and organelle markers, ESCRT I complex subunit TSG101, Exosome marker
免疫原	KLH 偶联的人 TSG101 合成肽
Uniprot ID	Q61187
抗体亚型	IgG, κ
克隆号	SB105
纯化方式	亲和纯化
预测分子量 / 观测分子量	44 kDa / 46 kDa

应用

WB 免疫印迹

物种：人，小鼠，大鼠

稀释比：1: 1000-1: 3000

阳性样品：心


背景

Component of the ESCRT-I complex, a regulator of vesicular trafficking process. Binds to ubiquitinated cargo proteins and is required for the sorting of endocytic ubiquitinated cargos into multivesicular bodies (MVBs). Mediates the association between the ESCRT-0 and ESCRT-I complex. Required for completion of cytokinesis; the function requires CEP55. May be involved in cell growth and differentiation. Acts as a negative growth regulator. Required for the exosomal release of SDCBP, CD63 and syndecan (By similarity).

储存条件

储存条件：自收到之日起 -20°C下储存一年，避免反复冻融。
储存缓冲液：含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



WB 检测 TSG101 蛋白(货号 K546857).
 样品: 经 RIPA 裂解液(货号 KSG2002)处理的蛋白质.
 封闭: 3%脱脂牛奶(货号 KSGC310001)溶于 TBST 溶液, 室温孵育 1 小时.
 一抗: 1: 1000 稀释, 4°C 孵育过夜.
 二抗: HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) (货号 KB69909), 1: 5000 稀释, 室温孵育 1 小时.

For Research Use Only!
Ver. No.: V1-202603