

Recombinant Anti-Granzyme B antibody (小鼠单克隆抗体)

K545276 -20°C



产品信息

蛋白质全称	颗粒酶 B
别名	CCPI, CGL 1, CGL1, CSP B, CSPB, CTLA1, CTSGL1, Endogenous granzyme B, Granzyme B, GZMB, HLP, SECT
免疫原	人重组 Granzyme B protein 在 HEK293 细胞中表达
Uniprot ID	P10144
抗体亚型	IgG1, κ
克隆号	SB112
纯化方式	亲和纯化
亚细胞定位	分泌型, 胞质颗粒

应用

IHC/IF 免疫组织化学/免疫荧光

物种: 人

稀释比: 1: 500-1: 1000

阳性样品: T 细胞淋巴瘤, 扁桃体


背景

Abundant protease in the cytosolic granules of cytotoxic T-cells and NK-cells which activates caspase-independent pyroptosis when delivered into the target cell through the immunological synapse. It cleaves after Asp. Once delivered into the target cell, acts by catalyzing cleavage of gasdermin-E (GSDME), releasing the pore-forming moiety of GSDME, thereby triggering pyroptosis and target cell death. Seems to be linked to an activation cascade of caspases (aspartate-specific cysteine proteases) responsible for apoptosis execution. Cleaves caspase-3, -7, -9 and 10 to give rise to active enzymes mediating apoptosis.


储存条件

储存条件: 自收到之日起 -20°C下储存一年, 避免反复冻融。
储存缓冲液: 含 0.15% ProClin300 防腐剂, 100 μg/mL 牛血清白蛋白和 50%甘油的磷酸盐缓冲液。

图像



IHC 检测 Granzyme B 蛋白(货号 K545276).
 样品: 人 T 细胞淋巴瘤, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟。
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟。



IHC 检测 Granzyme B 蛋白(货号 K545276).
 样品: 人扁桃体, 4%多聚甲醛 (货号 KSG1101) 固定 12-24 小时。
 抗原修复: 柠檬酸抗原修复液(干粉, pH 6.0) (KSG1201), 高压锅均匀喷气计时 2 分钟。
 一抗: 1: 800 稀释, 4°C 孵育过夜。
 二抗: S-vision 免疫组化多聚二抗(山羊抗小鼠), 即用型 (货号 KB3903), 室温孵育 20 分钟。

For Research Use Only!

Ver. No.: V1-202603